



STAP 4

Als de zetpil binnen 10 min verloren wordt, kan een nieuwe ingebracht worden.

- Het verdient aanbeveling om voor het inbrengen van de zetpil eerst naar het toilet te gaan (om de darm en blaas te legen).
- Bij gevoelige anus de zetpil glad maken met een beetje water, dit vergemakkelijkt het inbrengen.
- Het is de bedoeling dat na het inbrengen de zetpil zolang mogelijk in de darmen blijft, daarom is het meestal het gemakkelijkst om een zetpil voor het slapengaan in te brengen.
- De zetpil smelt niet.

STAP 3

Draai de dop helemaal rond (360°) om de sluiting te verbreken (zie fig. 1).

STAP 4

Omvat de klysmaflacon met de rechterhand (evt. de linkerhand) binnen de plasticzak (zie fig. 2).

STAP 5

Toediening kan het beste plaatsvinden als men met een opgetrokken rechterknie op de linkerzijde ligt (bij eventueel gebruik van de linkerhand de rechterzijde met opgetrokken linkerhand) (zie fig. 3).

STAP 6


Breng het uiteinde van de klysmaflacon voorzichtig via de anus in en knijp rustig de vloeistof uit de flacon.

STAP 7

Haal de flacon terug als de flacon leeg is. Houd hierbij de flacon ingedrukt. Het is normaal dat er een klein laagje vloeistof in de klysmaflacon achterblijft.

STAP 8

Trek de beschermende plastic zak over de punt van de flacon, zodat deze zonder besmettingsgevaar kan worden weggegooid.



STAP 9

Blijf hierna 5-10 min liggen, zodat de vloeistof dieper in de dikke darm kan doordringen.

- Een bezoek aan het toilet is aan te bevelen voor het gebruik van de klysmas.
- Gebruik oud goed of leg een absorberend matrasje onder uw billen.
- Het is de bedoeling dat de vloeistof zo lang mogelijk in de darmen blijft, het gemakkelijkste gaat dat als u na het inbrengen een tijd blijft liggen. Bijv. klysmas inbrengen voor het slapengaan.
- De klysmaflacon heeft een terugslagklep. Hierdoor kan de inhoud beetje bij beetje in de darmen worden gebracht.

Hoe zet je de Pentasa zetpil:



<http://www.pentasa.nl/film-en-materialen.aspx>

Hoe gebruik je het Pentasa klysmas:



<http://www.pentasa.nl/film-en-materialen.aspx>

Pentasa klysmas 1g/100ml

Het volume van de Pentasa klysmas geeft een spreiding vanuit de anus tot aan de miltflexuur.

STAP 1

Verwijder de aluminiumverpakking van de klysmas.

STAP 2

Schud de flacon voor gebruik.



Voor meer informatie:

gripopIBD

De plek voor informatie en advies over IBD
www.gripopibd.nl

FERRING
PHARMACEUTICALS

Ferring B.V.
Postbus 184, 2130 AD Hoofddorp,
Tel.: 023-568 03 00, Fax: 023-568 03 03
E-mail: info@ferring.com Internet: www.ferring.nl

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK



PENTASA
MESALAZINE

U aangeboden door **FERRING**
PHARMACEUTICALS

PA/2889/2016/NL

Uw arts heeft u het geneesmiddel Pentasa voorgeschreven.

PRODUCTOVERZICHT ORAAL



Pentasa Compact 4g, 2g en 1g sachet (granulaat)

Pentasa tablet 500mg en 1g


GEBRUIKSIJNSTRUCTIE ORAAL

Pentasa Compact 4g, 2g en 1g sachets

In het 1g, 2g en 4g sachet zitten kleine korreltjes die de werkzame stof mesalazine bevatten. Deze toedieningsvorm dient op een speciale manier te worden ingenomen. Pentasa sachet mag met de maaltijd ingenomen worden, maar het mag ook op een ander tijdstip worden ingenomen. Wij adviseren om de sachet(s) op een vast tijdstip in te nemen.

STAP 1

Scheur de sachet bij de stippellijn open.



STAP 2

Schud de inhoud van het sachet zo ver mogelijk achter op de tong, om te voorkomen dat de korrels tussen uw tanden blijven zitten.



STAP 3

Slik de korrels door met een glas water, vruchtensap, thee of andere drank. **Niet op de korrels kauwen.**



Alternatief met bijvoorbeeld yoghurt
Strooi de korreltjes op een lepel vla, yoghurt of appelmoes. Neem een hap en slik de hap door, **niet op korrels kauwen.**



- De korrels niet in een glas water of andere drank strooien, de korrels lossen namelijk niet op en blijven achter in uw glas of mond.
- In sommige gevallen duurt het 3-4 weken om aan deze toedieningsvorm te wennen.
- Soms komen er in de ontlasting lege omhulsels van de korreltjes voor. De werkzame stof mesalazine is wel vrijgekomen maar het lege omhulsel wordt niet altijd verteerd en komt met de ontlasting naar buiten.



Hoe gebruikt je het Pentas sachet:



<http://www.pentasa.nl/film-en-materialen.aspx>

Pentasa tablet 500mg en tablet 1g

Pentasa tablet mag met de maaltijd ingenomen worden, maar het mag ook op een ander tijdstip worden ingenomen. De tablet bestaat uit kleine korreltjes die zijn samengeperst. Wij adviseren om de tabletten op een vast tijdstip in te nemen.



STAP 1

Druk een tablet vrij uit de zilverkleurige doordrukstrip.

STAP 2

Neem de tablet in de mond en slik in zijn geheel door met een slokje water of een andere drank (bijvoorbeeld vruchtensap of dunne yoghurt).

Of STAP 2

Tablet eerst breken en met een slokje water of een andere drank innemen.

Of STAP 2

Tablet binnen een paar minuten eerst in een glas of op een lepel water of andere drank uiteen laten vallen en dan innemen. Let op dat u alle korreltjes die zo ontstaan inneemt zonder te kauwen.



Hoe neem je de Pentasa tabletten in:



<http://www.pentasa.nl/film-en-materialen.aspx>

PRODUCTOVERZICHT RECTAAL



Pentasa klysma 1g/100 ml

Pentasa zetpil 1g

GEBRUIKSIJNSTRUCTIE RECTAAL

Pentasa zetpil 1g

De Pentasa zetpil heeft een ovale vorm. Het maakt niet uit welke kant u als eerste inbrengt.



STAP 1

Open de folieverpakking.

STAP 2

Doe een vingerbeschermmer om de vinger waarmee u de zetpil wilt inbrengen.

STAP 3

Breng voorzichtig de zetpil in de anus totdat weerstand gevoeld wordt. Eventueel kunt u op één zij gaan liggen en de knie die bovenop ligt, optrekken.