



Cortiment[®]MMX[®]

Ook bij
microscopische
colitis geïndiceerd

Patiënteninformatie

FERRING
PHARMACEUTICALS

Cortiment, Evidence Based voorschrijven!

Cortiment, enige orale glucocorticosteroïd geïndiceerd voor actieve mild tot matige CU als 5-ASA onvoldoende blijkt.

Geïndiceerd bij volwassenen voor de inductie van remissie bij patiënten met lichte tot matig-ernstige actieve colitis ulcerosa (CU) als behandeling met 5-ASA onvoldoende resultaat heeft en bij inductie van remissie bij patiënten met actieve microscopische colitis

Cortiment opgenomen in ECCO-richtlijnen:

11D: Budesonide MX 9 mg/day can be considered in patients with mild to moderate disease who are intolerant or refractory to aminosalicylates.¹

Escalatie-therapie bij milde tot matige actieve colitis ulcerosa



Naam van het geneesmiddel: Cortiment 9 mg.
Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling: Een tablet bevat 9 mg budesonide.
Formuleerische vorm: tabletten met verlengde afgifte. **Therapeutische indicaties:** Inductie van remissie bij volwassenen met lichte tot matig ernstige actieve colitis ulcerosa als behandeling met 5-ASA onvoldoende resultaat heeft. De inductie van remissie bij patiënten met actieve microscopische colitis **Contra-indicaties:** Overgevoeligheid voor de werkzame stof, sojaolie of pinthoolie of voor één van de hulpstoffen. **Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik:** Gebruik met voorzichtigheid bij patiënten met een infectie, hyperthermie, diabetes mellitus, osteoporose, ulcus pepticum, glaucoom of cataract, of wanneer diabetes of glaucoom in de familie voorkomt, of met andere aandoeningen waarbij het gebruik van glucocorticoiden ongewenste effecten kan hebben. Bij het optreden van symptomen als zwijg zien of andere visusstoornissen, moet men alert zijn op cataract, glaucoom of zeldzame ziekten zoals centrale senzeuze choroïdopatie (CSCR). Het overstappen van of samenhangen met veranderende in de systemische steroïdenwaarden of kunnen allergische symptomen optreden die eerder door het systemisch geneesmiddel onder controle werden gehouden. Bij overstappen van een systemische corticosteroïd behandeling met een hoger systemisch effect, is tevens onderdrukking van de bijtjerschoris waargenomen. Door suppressie van de ontstekingsreactie en het immuunsysteem neemt de vatbaarheid voor en de ernst van infecties

toe. Corticosteroïden kunnen suppressie van de HPA-axos veroorzaken en de stressrespons verminderen. Wanneer patiënten een operatie of andere stressvolle situaties ondergaan, wordt aanvullende behandeling met systemische corticosteroïden aanbevolen. Wanneer de behandeling wordt gestopt kan het nuttig zijn om de dosis geleidelijk aan te verlagen. Bijzondere zorg is noodzakelijk bij patiënten met bestaande of eerdere ernstige effectieve stoornissen of wanneer deze voorkomen bij familieleden in de eerste graad. Er kunnen systemische effecten van steroïden optreden, met name wanneer deze worden voorgeschreven in hoge doses of gedurende langere tijd. Cortiment tabletten bevatten lactosomonoohydrate en mogen daarom niet worden ingenomen door patiënten met zeldzame erfelijke glucose-galactose intolerantie. Wees voorzichtig met gelijktijdig gebruik van Cortiment met potente CYP3A4-remmers zoals ketoconazol of met grote hoeveelheden grapefruitsap. Omdat bekend is dat corticosteroïden een immunologisch effect hebben, is het waarschijnlijk dat gelijktijdige toediening van Cortiment tabletten de immunreactie op vaccins vermindert. **Bijwerkingen:** vaak komt voor: misselijkheid, pijn in de (boven) buik, opgezette buik, droge mond, dyspepsie, hoofdpijn, sloepstoelheid, acne, vermoeidheid, mydriase, daling cortisolvwaarde in bloed. **Registratiehouder:** Ferring B.V., Polarisovene 130, 2132 JX, Hoofddorp. **Atleverstus:** U.R.

Vergoeding: Wordt volledig vergoed. **Datum tekst:** juli 2022



Uw arts heeft u het geneesmiddel
Cortiment® voorgeschreven.

Hoe werkt Cortiment?

Cortiment® tabletten bevatten het werkzame bestanddeel met de naam budesonide. Budesonide behoort tot een categorie geneesmiddelen die 'corticosteroiden' worden genoemd. Deze worden gebruikt voor het verminderen van een ontsteking.

Budesonide wordt met een geregleerde snelheid afgegeven in het darmkanaal door de gehele dikke darm. Budesonide is een glucocorticoïd dat wordt gebruikt bij de behandeling van ontstekingsziekten van de darm. Het heeft een plaatselijk, ontstekingsremmend effect in de dikke darm.



Hoe kunt u Cortiment het beste gebruiken?



Dosering
1 x daags één
tablet van 9 mg
in de ochtend.



Inname
Kan met of zonder
maaltijd worden
ingenomen.



Inname
Met één glas
water innemen.



Duur
Max. 8 weken. Afbouwen
om de dag gedurende
een week.



Dosering

- Cortiment® 9 mg, 30 tabletten per verpakking
- Tablet niet breken
- Cortiment® is niet uitwisselbaar met andere budesoniden
- Cortiment® tabletten bevatten lactose, een soort suiker. Als u door uw arts bent verteld dat u sommige suikersoorten niet kunt verdragen, neem dan voordat u met het gebruik van dit geneesmiddel begint contact op met uw arts.
- Cortiment® bevat lecithine (sojaolie). Als u allergisch bent voor pinda's of soja gebruik dit geneesmiddel dan niet.

Heeft u behoefte aan meer informatie, ga dan naar cortiment.nl. Raadpleeg voor gebruik altijd de bijsluiter in de verpakking.